

# Vaccination av barn

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.

- Föreskrifter är bindande regler.
- Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post [socialstyrelsen@strd.se](mailto:socialstyrelsen@strd.se)

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2006-10-22

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2006

## Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn;

SOSFS  
2006:22 (M)

beslutade den 21 november 2006.

Utkom från trycket  
den 8 december 2006

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

### Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas vid vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården.

### Vaccinationsprogram

2 § Barn- och skolhälsovården skall till alla vårdnadshavare erbjuda vaccination av de barn som är födda år 2002 eller senare, i enlighet med följande program.

Ålder	Barnhälsovård					Skolhälsovård	
	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5–6 år	6–8 år	14–16 år
Årskurs						1–2	8–9
Difteri	I	II	III		IV		V
Stelkramp							
Kikhosta							
Polio							
Hib							
Mässling				I		II	
Påsjuka							
Röda hund							

Kommentar: Övriga vaccinationsprogram, se 6 §.

3 § Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta skall dos I-IV ges som fulldosvaccin och dos V ges med reducerad antigenhalt.

4 § Utgångspunkten för beräkningen av tidpunkten för vaccination skall vara ett barns kronologiska ålder, även om barnet är för tidigt fött.

5 § Inom ramen för ovanstående program får tidpunkten för vaccination förskjutas enligt följande:

1. Dos I–III för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib får ges två veckor före den i programmet rekommenderade åldern, dock med minst sex veckors intervall mellan dos I och II och sex månaders intervall mellan dos II och III.
2. Dos I för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib får ges upp till sex månaders ålder. Dos II får ges upp till fyra månader efter dos I. Dos III får ges upp till två års ålder, dock med ett intervall av sex månader mellan dos II och III.
3. Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från tolv månaders ålder.

### Övriga vaccinationsprogram

6 § För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker och influensa har Socialstyrelsen givit ut följande allmänna råd och rekommendationer:

1. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa
2. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker
3. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition
4. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

### Kompletterande vaccinationer

7 § Barn som är födda före år 2002 skall erbjudas vaccination i enlighet med *bilagorna 1* och *2*.

8 § Barn upp till 18 års ålder skall erbjudas kompletterande vaccination, om de inte tidigare har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 §.

### Övrigt

9 § Avsteg från vaccinationsprogrammet i 2 §, utöver de som anges i dessa föreskrifter, får göras genom ordination av den ansvarige läkaren inom barn- och skolhälsovården.

- 
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.
  2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:1) Vaccination av barn.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Anders Tegnell  
(Smittskyddsenheten)

**Schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio**

<b>Årskohorter</b>	<b>Schema</b>	<b>Barnhälsovården</b>	<b>Skolhälsovården årskurs 4</b>	<b>Skolhälsovården årskurs 8 eller 9</b>
Barn födda		5–6 års ålder	9–11 års ålder	14–16 års ålder
1995	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2000–01	DTP åk 4 läsår 2005–06	
1996	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2001–02	DTP åk 4 läsår 2006–07	
1997	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2002–03	DTP åk 4 läsår 2007–08	
1998	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2003–04	DTP åk 4 läsår 2008–09	
1999	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2004–05	DTP åk 4 läsår 2009–10	
2000	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2005–06	DTP åk 4 läsår 2010–11	
2001	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2006–07	DTP åk 4 läsår 2011–12	
2002	3+5+12 mån. +5–6 år +14–16 år	DTP-IPV år 2007–08		dTp åk 8 läsår 2016–17 eller åk 9 läsår 2017–18
2003	3+5+12 mån. +5–6 år +14–16 år	DTP-IPV år 2008–09		dTp åk 8 läsår 2017–18 eller åk 9 läsår 2018–19

## Schema för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskohorter	Schema	Barnhälsovården	Skolhälsovården årskurs 1–2	Skolhälsovården årskurs 6
Barn födda		18 mån. ålder	6–8 års ålder	12 års ålder
1995	18 mån. +12 år	MPR år 1996–97		MPR åk 6 läsår 2007–08
1996	18 mån. +12 år	MPR år 1997–98		MPR åk 6 läsår 2008–09
1997	18 mån. +12 år	MPR år 1998–99		MPR åk 6 läsår 2009–10
1998	18 mån. +12 år	MPR år 1999–00		MPR åk 6 läsår 2010–11
1999	18 mån. +12 år	MPR år 2000–01		MPR åk 6 läsår 2011–12
2000	18 mån. +12 år	MPR år 2001–02		MPR åk 6 läsår 2012–13
2001	18 mån. +12 år	MPR år 2002–03		MPR åk 6 läsår 2013–14
2002	18 mån. +6–8 år	MPR år 2003–04	MPR åk 1 läsår 2009–10 eller åk 2 läsår 2010–11	
2003	18 mån. +6–8 år	MPR år 2004–05	MPR åk 1 läsår 2010–11 eller åk 2 läsår 2011–12	

