

Interpellation av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms Stad

Antalet anmälda fall av klamydia har ökat med 50% i Stockholms län sedan år 2000. Ökningen är störst bland män. Högst frekvens av klamydia finns bland kvinnor i åldrarna 15 – 29 år och för män i åldrarna 20 – 35 år. Totalt beräknas 7 300 personer förvärva klamydia i Stockholms län under år 2005. Detta är exempel på en smittsam sjukdom där rutinerna kring provtagning m m måste fungera väl.

En undersökning har gjorts av Beställare Vård om hur STI-rutinerna fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms Stad. STI är den gemensamma beteckningen av klamydia, HIV, gonorré och syfilis.

Av enkäten framgår bl a följande:

- två mottagningar tar ut patientavgift trots att provtagningen i princip ska vara kostnadsfri.
- några mottagningar kallar inte partnern till omgående provtagning trots att det medför risk att smittan sprids vidare.
- 14% av mottagningarna erbjuder inte anonym provtagning vid HIV-test trots att patienten har rätt till det.
- endast 33% av mottagningarna redovisar helt korrekta STI-rutiner.

Rent allmänt är rutinerna av högre kvalitet i innerstaden. Behovet av förbättringar är störst i Söderort.

Jag vill därför fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd följande:

- Tycker du att STI-rutinerna fungerar tillfredställande vid vårdenheter i Stockholms län?
- Om inte, vilka åtgärder tänker du vidta?

Stockholm den 6 oktober 2005

Cecilia Carpelan (fp)