

Svar på interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med förlossningar

Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande frågor:

- Vilka åtgärder kommer du att vidta i avsikt att minska bristningsskadorna vid förlossningar?
- Hanteras förlossningssprickor alltid av specialister i SLL?

Som svar vill jag anföra följande:

Bristningar i samband med förlossningar delas in i fyra grader. Barnmorskor syr första och andra gradens bristningar. Tredje och fjärde gradens bristningar är allvarligare bristningar. Socialstyrelsen följer årligen upp tredje och fjärde gradens bristningar.

Alla förlossningsenheter arbetar systematiskt med att minska antalet större bristningar. Detta sker till exempel genom att öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och arbete med förlossningstekniker. Kända riskfaktorer är om kvinnan är förstföderska, barnet är stort och om förlossningen avslutas med sugklocka eller tång.

Genomgångar av förlossningar med större bristningar av tredje och fjärde graden sker regelbundet. Syftet är att analysera omständigheterna under förlossningarna och om skadorna hade kunnat undvikas. Det sker även en noggrann registrering av antalet skador.

Landstinget har ett vårdprogram för större bristningar och frågan tas upp årligen vid uppföljningsbesöken på förlossningsenheterna.

Ett specifikt projekt har genomförts på Södersjukhuset. Där upptäcktes att förlossningsvården under senare år har blivit mer uppmärksam på bristningar och nu även rapporterar mindre skador. Det pågår en pilotstudie på Södersjukhuset i form av en enkät med en återuppföljning 12-18 månader efter förlossningarna. Syftet är att se om kvinnorna då har några besvär efter förlossningarna.

Större bristningar sys främst av specialister. I undantagsfall sys de av en erfaren ST-läkare under handledning av specialist. Vid behov konsulteras kirurg.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt